


Expedientes de lobotomía

La utilización de los registros de psicocirugía

LÍDIA M. RAMOS SERRA



El periódico estadounidense *The Wall Street Journal* publicó recientemente “Los expedientes de lobotomía” <wsj.com/lobotomyfiles>, un proyecto multimedia (palabras, imágenes, gráficos, vídeo y audio) sobre la utilización de las lobotomías para tratar a unos 2.000 veteranos con enfermedades mentales.

A partir de las historias clínicas conservadas en los Archivos Nacionales y de la información de los afectados y sus familias Michael Phillips conforma un conmovedor relato de los traumas sufridos por los veteranos de la Segunda Guerra Mundial desde un equivocado intento de aliviar su estrés a través de una cirugía cerebral traumática.

En el proyecto se ponen de manifiesto los tratamientos impactantes que se realizaron en un hospital de Oregón, donde a cuatro veteranos con enfermedades mentales les realizaron falsas lobotomías para

ver si se producía un efecto placebo. Como no sucedió, el doctor les realizó lobotomías reales. Y en el hospital Roanoke VA aparecen dos veteranos que fueron lobotomizados por

habérsele diagnosticado “psicosis, con personalidad psicótica (homosexualidad)”.


El tratamiento de pacientes con enfermedades psiquiátricas siempre fue una preocupación





de los especialistas para curar o reducir sus síntomas y los problemas conductuales asociados.

La psicocirugía se ha utilizado como metodología de tratamiento desde 1936 en pacientes con enfermedades mentales graves. La lobotomía fue la primera técnica de psicocirugía desarrollada por el portugués Egas Moniz, por la que obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1949. La psicocirugía consiste en destruir la conexión de fibras de una parte del cerebro con otras partes del mismo, de manera que mejoren los síntomas o eliminen los trastornos mentales y conductuales característicos de variadas enfermedades psiquiátricas. Se defendía su aplicación en situaciones graves de depresión, en pacientes que intentasen el suicidio o que fuesen violentos, como el caso de los veteranos de guerra. A estas personas, la experiencia de la guerra les acarreó incapacidades y enfermedades físicas y psicológicas para toda la vida. El desarrollo de la sintomatología psiquiátrica fue frecuente



y les impidió una reintegración normal en sus contextos de vida, es decir, volver a manifestar conductas normales y adecuadas en la sociedad. Sin embargo, muchas de estas personas cuando fueron sometidas a la psicocirugía o no resistieron la intervención o cambiaban considerablemente su personalidad.

Actualmente, las terapias aplicadas a los pacientes con enfermedades psiquiátricas se basan, fundamentalmente, en la combinación de la psicoterapia, intervención farmacológica y terapia electroconvulsiva (para casos específicos).

Sin embargo, estas intervenciones siguen necesitando de más estudios orientados tanto a los avances en los procedimientos de la neurocirugía, como en otras áreas: neurobiología, neuropsicología, psiquiatría, imagen funcional, etc.

Estos conocimientos permitirán entender mejor el funcionamiento cerebral y, consecuentemente, ayudarán a proporcionar una mejor calidad de vida a los pacientes con trastornos psiquiátricos. ■